

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

Piせき止め液

Piせき止め液は、せきをしずめる南天実、たんをだしやすくする麦門冬・桔梗、その他鎮咳・去痰成分を配合したせき・たんの効果のある液剤です。

⚠〔使用上の注意〕

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 過量服用・長期連用しないでください

(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。)

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬

※3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

4. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき

〔効能・効果〕

せき、たん

〔用法・用量〕

次の1回量を食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。また、場合により1日6回まで服用できますが、このような場合は約4時間の間隔をおいてください。なお、服用の際は、添付の計量カップではかって服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	10 mL	3回 また、止むを得ない場合には約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用できます。
11歳以上15歳未満	6.5 mL	
8歳以上11歳未満	5 mL	
5歳以上8歳未満	3.3 mL	
3歳以上5歳未満	2.5 mL	
1歳以上3歳未満	2 mL	
1歳未満の乳児	服用しないでください。	

裏面も必ずお読みください

