

この説明書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

第2類医薬品

ぜんそく・せき・たん [鎮咳去痰薬]

アドレニン[®]エースシロップ

ぜんそくの原因にはアレルギー性、感染性、心因性、自律神経の異常、公害（大気汚染）などがありますが、必ずしも一つの原因ではなく、いくつかの原因が重なって発病することが多いものです。

ぜんそくの発作のタイプには、せきやたんがはじめから多いもの、せきはあまり出ずに呼吸が苦しいというもの、また季節性のもなどがあります。いずれにしても、これらの症状は呼吸器や心臓などに悪い影響をあたえ、余病をひきおこす原因ともなりますので早めに取り除くことが肝要です。

アドレニンエースシロップは、せきやぜんそくをしずめるジプロフィリンなどの成分の他に、生薬成分オンジ、ゴミシ、ニンジン、南天実を配合したぜんそく、せき、たんによく効く、かっ色の甘くて飲みやすいプラム味のシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	動悸、排尿困難

- (2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
□のかわき

■ 効能・効果

ぜんそく、せき、たん

■ 用法・用量

1日4回、食後及び就寝前に次の量を服用してください。場合により1日6回まで服用できますが、この場合約4時間の間隔をおいて服用してください。

年 齢	1回量
15才以上	10mL
11才～15才未満	6.5mL
8才～11才未満	5mL

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を必ず守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)薬液の分取には、添付の計量カップをご使用ください。
- (4)使用後の計量カップは水等で洗浄し清潔に保管してください。
- (5)本剤は、生薬エキスを配合していますので、わずかに混濁を生じることがありますが、薬効には影響ありません。



■ 成分と働き


60mL中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	働 き
ジプロフィリン	140mg	気管支を拡張して、せきやぜんそくを緩和します。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg	気管支の緊張をやわらげ、せきをしずめます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	気管支の収縮を防ぎ、せきの発作を起こしにくくします。
オンジ流エキス (原生薬換算量 600mg)	0.6mL	たんをきり、せきをしずめる効果があります。
ゴミシ流エキス (原生薬換算量 600mg)	0.6mL	せきを止め、たんをきる効果があります。
ニンジン軟エキス (原生薬換算量 636.3mg)	210mg	ぜんそく、呼吸困難を緩和する効果があります。
南天実流エキス (原生薬換算量 1100mg)	1.1mL	せきやぜんそくをしずめる効果があります。

添加物としてパラベン、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、カラメル、プロピレングリコール、アルコール、香料、白糖を含んでいます。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



製造販売元
三宝製薬株式会社

東京都新宿区下落合2-3-18