

台製薬
副産品

アドレニン E-スロップ

120ml 第②類医薬品

〔販売名〕 アドレニンE-スロップ

※2016年1月改訂
(効成効量表に併せて改訂)

第②類医薬品

この外箱の説明文は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に認めるよう保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故
が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬等(風炎症内服薬、異物酔い薬、アレキギー用薬等)
2. 服用後、異物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)

☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、(3) 授乳中の人、(4) 高齢者、(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人、(6) 次の症状のある人。高熱、排尿困難、(7) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、甲状腺機能障害、てんかん

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	心悸
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	胃あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、骨が響くなどになりやすくなる。血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

生薬配合 120mL

アドレニン E-スロップ

●ニンジン軟エキス ●オンジ流エキス配
●南天実流エキス ●ゴミシ流エキス配

プラム味 第②類医薬品

〔効能・効果〕

せき、たん、喘息(せーせー、ひゅーひゅー)をとまらうせき

〔用法・用量〕

1日4回、食後及び就寝前に次の量を服用してください。場合により1日6回まで服用できますが、この場合約4時間の間隔をおいて服用してください。

年齢	1回量
15才以上	10mL
11才～15才未満	6.5mL
8才～11才未満	5mL

(添付の計量カップを
ご使用ください。)

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を必ず守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 薬地の分取には、添付の計量カップをご使用ください。
- (4) 服用後の計量カップは水等で洗浄し清潔に保管してください。

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(製薬会社) 佐藤製薬株式会社
http://www.sato-ph.co.jp/kouhou/sakusai/naiseki.html
電話 0120-149-531 (フリーダイヤル)



生薬配合 120mL

アドレニン E-スロップ

●ニンジン軟エキス ●オンジ流エキス配
●南天実流エキス ●ゴミシ流エキス配

プラム味 第②類医薬品

せき・たん・喘鳴
(せーせー、ひゅーひゅー)
をとまらうせき

生薬配合 120mL

アドレニン E-スロップ

●ニンジン軟エキス ●オンジ流エキス配
●南天実流エキス ●ゴミシ流エキス配

プラム味 第②類医薬品

〔成分・分量〕

60mL中
ジプロピリン……………140mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………40mg
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg
オンジ流エキス
(原生薬換算量 600mg)……………0.6mL
ゴミシ流エキス
(原生薬換算量 600mg)……………0.6mL
ニンジン軟エキス
(原生薬換算量 636.3mg)……………210mg
南天実流エキス
(原生薬換算量 1100mg)……………1.1mL
添加物としてパラベン、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、カラメル、プロピレングリコール、アルコール、香料、白糖を含んでいます。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 服用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 本剤は、生薬エキスを配合していますが、わずかに発酵を生じることがありますが、薬効には影響ありません。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〔お客様相談室〕

電話03-3952-0100
月～金曜日(9:00～17:00)(祝日を除く)



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18

A115K



4 961248 000596

紙箱 プラカップ : PS
カップ袋 : PP

C222