

第2類医薬品 **せき・たんに 鎮咳去痰薬**

# イスエスブロン液<sup>®</sup>

SS BRON<sup>®</sup> SOLUTION-L

苦しいせきは、わずらわしいばかりでなく、安眠を妨げたり、体力を消耗したりします。また、のどにからむたんもたいへん不快なものです。

イスエスブロン液<sup>®</sup>は、せきをしずめる成分、たんの排出をうながす成分などを配合した、せき・たんによく効く、のみやすいシロップ剤です。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の人は服用しないでください

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)



### ■ 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。 緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

#### 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

## ■ 効能・効果

せき、たん

## 用法・用量

次の1回量を、添付の目盛付コップではかり、いずれも1日3回食後に服用します。なお、場合により4時間毎に1日6回まで服用することができます。

年齢	成人(15才以上)	11才~14才	8才~10才	8才未満
1回量	5mL	3.3mL	2.5mL	服用しないこと

※目盛付コップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分と作用

成分	30mL中	作用
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	60mg	延髄にあるせきのコントロール中枢に作用し、せきの発生をおさえます。
グアイフェネシン	170mg	気道粘膜の分泌機能をたかめ、たんをうすめて排出をうながします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきをしずめます。
無水カフェイン	62mg	他の成分の働きをたすけます。

添加物として、果糖ブドウ糖液糖、アルコール、プロピレングリコール、塩化Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エチルバニリン、カラメル、バニリン、*l*-メントール、香料を含有します。

## せき・たんの治療には…………

本剤の服用のほか、次のようなことにも気をつけましょう。



睡眠、栄養を十分にとり体力の回復に努めましょう。



室内の空気の乾燥をさげましょう。



うがいなどをしてのをいたわりましょう。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)キャップをしめる際、ビンの口をよく拭いてからしめてください。ビンの口に薬液が付着したままキャップをしめると、まれにあげにくくなる場合があります。また、しめ方が悪いと内容液が漏れ出たり汚染することがあります。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

## お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>