

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

Ⓕ

説明文書改訂年月  
2013年3月  
(記載要領変更に伴う改訂)

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

# ガン<sup>®</sup>せき止め錠

シオンエキス配合

せきは、のどや気管支の病気や外的な刺激に伴って、特に春先のような気候の変わり目、寒い冬に多くおこります。

せきが激しかったり、長く続くと体力を消耗し、安眠が妨げられると共に諸種の生体機能に障害を与えたりしますから、できるだけ早く治療することが大切です。

ガン<sup>®</sup>せき止め錠は、せきをしずめる成分に、生薬で去痰作用を持つシオンエキスを配合した鎮咳去痰薬です。



## 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気等があらわれることがある。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 過量服用・長期連用しないこと

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

裏面もお読みください。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 成分・分量、はたらき

ガノンせき止め錠は9錠(成人1日量)中、次の成分を含みます。

薬効別	成分名	分量	主なはたらき
中枢性鎮咳剤	ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	咳の中枢に働いて、咳をしずめます。
気管支拡張剤	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげ、咳をしずめます。
抗ヒスタミン剤	クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー症状を改善します。
生薬鎮咳去痰薬	シオンエキス	600mg (シオン) (1500mg相当)	去痰作用によって、咳をしずめます。

添加物として、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、硬化油を含みます。

## 効能・効果

せき、たん

## 用法・用量

年齢	1回量	用法(1日服用回数)
成人(15歳以上)	3錠	1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。 服用間隔は4時間以上おいてください。
11歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上11歳未満	1錠	
5歳未満		服用させないでください。

### <用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。  
特に日光下の高温の車内には放置しないこと。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- ピンノフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがあるので、服用のつどフタをよくしめること。
- 品質を保持するため容器内に乾燥剤が入っているので誤って服用しないように注意すること。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室

電話：(052)951-2340

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

製造販売元：明治薬品株式会社 お客様相談室

電話：(03)3253-3451

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



発売元

**天野商事株式会社**

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号



製造販売元

**明治薬品株式会社**

富山県富山市三郷6番地