

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

セキオール

第2類医薬品

セキオールは、気管支を拡張してせきをしずめる成分、アレルギー性のせきに有効な成分、せきの原因となるたんを出しやすくする成分を配合した清涼感のある顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
- (7) 次の診断を受けた人。

高熱、排尿困難

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

(裏面もお読みください。)

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、 かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、 食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

(2)5～6回服用しても症状
がよくなる場合

3. 次の症状があらわれるこ
とがあるので、このよ
うな症状の継続又は増強が
見られた場合には、服用
を中止し、医師又は薬剤
師に相談してください

□のかわき

効能・効果

せき、ぜんそく、たん

用法・用量

次の量を、1日3回服用して
ください。服用間隔は4時間以上
おいてください。

年 齢	1回量
成人(15才以上)	1 包
15才未満	服用させない こと

〈用法・用量に関連する注意〉
用法・用量を厳守してください。

成分・分量 3包(1日量)中

成 分	分 量
トリメトキノール 塩酸塩水和物	6mg
グアヤコール スルホン酸カリウム	270mg
d-クロルフェニラミ ンマレイン酸塩	6mg

添加物としてD-マンニトール、無水クイ
酸、アスパルテーム(L-フェニルアラニ
ン化合物)、クロスカルメロースNa、ス
テアリン酸ポリオキシシル、トメントール
を含有します。 (1包:0.7g)

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気
の少ない涼しい所に保管し
てください。
- (2)小児の手の届かない所に保
管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないで
ください。(誤用の原因にな
ったり品質が変わります。)
- (4)表示の期限を過ぎたものは
服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口:(076)435-5055
午前9時から午後4時30分まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15-1