セキピタール

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	鎮咳去痰薬
承認販売名	
製品名	セキピタール
製品名（読み）	セキピタール
製品の特徴	
使用上の注意	**■してはいけないこと** **（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故が起こりやすくなる）** １．本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の鎮咳去痰薬，かぜ薬，鎮静薬，抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬，乗物酔い薬，アレルギー用薬等） ２．服用後，乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある．） ３．授乳中の人は本剤を服用しないか，本剤を服用する場合は授乳を避けること ４．過量服用・長期連用しないこと **■相談すること** １．次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人． (2)妊婦又は妊娠していると思われる人． (3)高齢者． (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人． (5)次の症状のある人． 高熱，排尿困難 (6)次の診断を受けた人． 心臓病，高血圧，糖尿病，緑内障，甲状腺機能障害，てんかん，呼吸機能障害，閉塞性睡眠時無呼吸症候群，肥満症 ２．服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること [関係部位：症状] 皮膚：発疹・発赤，かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐，食欲不振 精神神経系：めまい 循環器：動悸 泌尿器：排尿困難 まれに次の重篤な症状が起こることがある．その場合は直ちに医師の診療を受けること． ［症状の名称：症状］

	再生不良性貧血：青あざ，鼻血，歯ぐきの出血，発熱，皮膚や粘膜が青白くみえる，疲労感，動悸，息切れ，気分が悪くなりくらっとする，血尿等があらわれる． 無顆粒球症：突然の高熱，さむけ，のどの痛み等があらわれる． 呼吸抑制：息切れ，息苦しさ等があらわれる． 3．服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘，口のかわき，眠気 4．5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
効能・効果	たん，せき
効能関連注意	
用法・用量	1日3回食後服用して下さい． 15歳以上1回：1包 11歳以上15歳未満1回：2／3包 8歳以上11歳未満1回：1／2包 5歳以上8歳未満1回：1／3包 3歳以上5歳未満1回：1／4包 3歳未満：服用しないこと
用法関連注意	(1)用法及び用量を厳守してください． (2)小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させてください． (3)12歳未満の小児には，医師の診療を受けさせることを優先してください．
成分分量	3包(3g)中 成分：分量 ジヒドロコデインリン酸塩：30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩：50mg ノスカピン：60mg ジプロフィリン：100mg グアヤコールスルホン酸カリウム：270mg クロルフェニラミンマレイン酸塩：12mg
添加物	D-マンニトール，カルメロースカルシウム，乳糖水和物，結晶セルロース，バレイショデンプン，カルメロースナトリウム，グリチルリチン酸二カリウム，ヒドロキシプロピルセルロース，メタケイ酸アルミン酸マグネシウム
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください． (2)小児の手のとどかない所に保管してください． (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります．）． (4)1包を分割した残りを服用する場合には，袋の口を折り返して保管し，2日以内に服用してください． (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください．

消費者相談窓口	会社名:大協薬品工業株式会社 問い合わせ先:お客様相談窓口 電話:076-479-1313(土, 日, 祝日を除く)
製造販売会社	大協薬品工業(株) 添付文書情報 会社名:大協薬品工業株式会社 住所:富山県富山市水橋畠等173
販売会社	
剤形	散剤
リスク区分等	第「2」類医薬品