

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



せき・たんに  
**セピーセき止め顆粒**  
CEPIE COUGH GRANULE

鎮咳・去痰生薬配合

鎮咳去痰薬

**(特 徴)**

セピーセき止め顆粒は、せきを鎮める成分(ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩)、たんの切れをよくする成分(グアヤコールスルホン酸カリウム)にさらに4種類の生薬を配合した優れた鎮咳・去痰剤です。

**⚠ 使用上の注意**

**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

**\*\* 1. 次の人は服用しないでください**

- (1) 12才未満の小児。
- (2) フェニルケトン尿症の人。

**2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

**3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**

(眠気等があらわれることがあります。)

**4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**

**5. 過量服用・長期連用しないでください**

**相談すること**

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難

**\* (6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症**

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

\*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

**3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

便秘、口のかわき、眠気

(必ず裏面もお読みください)

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

せき、たん

## \*\*〔用法・用量〕

年 齢	1回量	用 法
成人（15才以上）	1包	1日3回、食後に服用してください。
12才以上15才未満	2/3包	
12才未満	服用しないでください。	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。

## 〔成 分〕 1日量(3包)中

ジヒドロコデインリン酸塩…………… 30mg キョウ乾燥エキス… 40mg(キョウ400mgに相当)  
dl-メチルエフェドリン塩酸塩…………… 75mg セネガ乾燥エキス…………… 27mg(セネガ405mgに相当)  
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… 6mg キョウニンエキス… 40mg(キョウニン400mgに相当)  
グアヤコールスルホン酸カリウム…………… 270mg ケイヒ末…………… 100mg  
添加物：アスバルテム（L-フェニルアラニン化合物）、D-マンニトール、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、香料

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080  
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11  
受付時間 9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

セビーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11