

せき・たんにも…ゼントル[®]シロップ[°]

ゼントルシロップは「せき」をしずめ「たん」の切れをよくします。
また、甘くて飲みやすいシロップ剤ですから、お子様からお年寄りまでの服用に適しています。
ゼントルシロップは「たん」のからむ「湿性のせき」にも有効であります。特に過剰な「空せき」に効力を発揮します。
睡眠時「せき」が出て眠れない、「せき」により体力が消耗する等、どうしても止めたい過剰な「せき」にはジヒドロコデインリン酸塩（咳中枢を抑制する中枢性鎮咳剤）を配合したゼントルシロップが有効です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気があらわれることがあります。）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 過量服用・長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人……高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人……心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕 本品 100mL中

ジヒドロコデインリン酸塩	50mg
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	125mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	450mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	20mg
無水カフェイン	200mg

添加物として、クエン酸Na、D-ソルビトール、白糖、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料を含有しています。

〔効能・効果〕

せき、たん

〔用法・用量〕

下記の1回量を1日3～4回、添付の計量コップにとり服用してください。
なお、場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用しても差し支えありません。

年 令	1 回 量
成 人 (15才以上)	10mL
11才以上～15才未満	6.6mL
8才以上～11才未満	5mL
5才以上～8才未満	3.3mL
3才以上～5才未満	2.5mL
1才以上～3才未満	2mL
3カ月以上～1才未満	1mL

- (1) 本剤は劇薬に該当する成分も含まれていますので、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けることを優先し、止むを得ない場合のみ服用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 計量コップは使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金（祝・祭日を除く）
9：00～17：00

発売元 **アスト製薬株式会社**
大阪市阿倍野区王子町3-4-15

製造販売元 **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地

