

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# せき・たんに **ネチルせきどめ液**

第②類医薬品

ネチルせきどめ液は、色々な原因で起こる“せき”をしずめ、“たん”の切れをよくします。またくだもの味をもった液剤ですから、どなたにも飲みやすくなっています。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)。
2. 服用後、眠気等があらわれることがあるので、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4. 過量服用・長期連用しないでください

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

関係部位	症 状
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 せき、たん

【用法・用量】 1回量

大人(15歳以上)…………… 5mL      12歳以上15歳未満…………… 3mL

12歳未満は服用しないでください。

1日3回食後及び必要な場合は就寝前にも服用してください。また、場合によっては1日6回まで服用しても差し支えないですが、1日5～6回服用される場合には、原則として約4時間の間隔をあけてください。

注意 (1) 用法及び用量を厳守してください。

(2) 15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 1日量(30mL)中

ジヒドロコデインリン酸塩…………… 24mg      無水カフェイン…………… 75mg  
 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 …… 60mg      キキョウエキス  
 クロルフェニラミンマレイン酸塩 …… 12mg      (原生薬キキョウとして1200mg) 300mg  
 添加物としてブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、カラメルを含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 品質が変わったり、誤用の原因になるので、他の容器に入れかえないでください。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

相談窓口 **萬金薬品工業株式会社**  
奈良県高市郡明日香村野口317

TEL 0744-54-2012  
受付時間：午前8:30から午後5:00まで(土、日、祝日を除く)

発売元 **米田薬品工業株式会社**  
大阪市天王寺区堀越町9番24号

製造販売元 **萬金薬品工業株式会社**  
奈良県高市郡明日香村野口317