

ヒットミンせき止めカプセル

項目	内容
医薬品区分	一般用医薬品
薬効分類	鎮咳去痰薬
承認販売名	
製品名	ヒットミンせき止めカプセル
製品名(読み)	ヒットミンセキドメカプセル
製品の特徴	<p>「せき」は、異物や分泌物などを体外へ排出して、身体を守ろうとする生体にとって有益な反射運動です。しかし、せきがはげしくなると体力の消耗を招いたり、安静や睡眠が妨げられたりして、病気の回復を遅らせたりすることになります。</p> <p>ヒットミンせき止めカプセルは、鎮咳剤(せき止め成分)と去たん剤(たんを出しやすくする成分)を配合したせき止め薬です。</p> <p>■特長</p> <ul style="list-style-type: none"> ●せきの中枢と気管支の両方に作用。 ●中枢性鎮咳剤のジヒドロコデインリン酸塩を配合。 ●たんを出しやすくするキキョウを配合 ●たんを溶解するリゾチーム塩酸塩を配合。
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用しないでください 本剤または本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬など) 3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気などがあらわれることがあります。) 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください 5. 過量服用・長期運用しないでください <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください <ul style="list-style-type: none"> (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。 (3) 高齢者。 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください <p>[関係部位:症状] 皮ふ:発疹・発赤、かゆみ</p>

消化器:吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系:めまい
泌尿器:排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称:症状]

ショック(アナフィラキシー):服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症:高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤などが持続したり、急激に悪化する。

再生不良性貧血:青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿などがあらわれる。

無顆粒球症:突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

呼吸抑制:息切れ、息苦しさなどがあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果	せき、たん
-------	-------

効能関連注意	
--------	--

用法・用量	食後服用してください。 [年齢:1回量:1日服用回数] 成人(15才以上):2カプセル:3回 8才以上15才未満:1カプセル:3回 8才未満:服用しないでください。
-------	--

用法関連注意	(1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)カプセルの取り出し方 カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりしますと食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。) (4)12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。
--------	---

成分分量	6カプセル中		
	成分	分量	内訳
	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	
	リゾチーム塩酸塩	60mg(加倍)	
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	
	無水カフェイン	150mg	
	キキョウ乾燥エキス	120mg	(原生葉換算量 1200mg)

添加物	アルファー化デンプン, 乳糖, 硬化油, ゼラチン, 酸化チタン, ラウリル硫酸Na
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手のとどかない所に保管してください。 (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) (4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。
消費者相談窓口	会社名:常盤薬品工業株式会社 問い合わせ先:お客さま相談室 電話:0120-875-710 受付時間:9:00~17:00(土, 日, 祝日を除く)
製造販売会社	常盤薬品工業(株) 会社名:常盤薬品工業株式会社 住所:大阪市中央区安土町3-5-12
販売会社	
剤形	カプセル
リスク区分等	第「2」類医薬品