

せき たんに

フスチン顆粒

リン酸ジヒドロコデイン 配合剤

3包入



大和中央製薬株式会社

奈良県橿原市北八木町1丁目6-16号
TEL 0744 (22) 2043



箱



外装フィルム
分包



医薬品

フスチン顆粒

効能又は効果

せき、たん

成分及び分量 1日量(3包) 中

リン酸ジヒドロコデイン..... 30mg

dL-塩酸メチルエフェドリン..... 75mg

マレイン酸クロルフェニラミン..... 7.5mg

グアイフェネシン..... 300mg

添加物: トウモロコシデンプン、ケイ酸アルミニウム、乳糖、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース

せきたんに

配置期限 2011.8 264

用法及び用量

大人15才以上..... 1回1包

11才以上15才未満..... 1回 $\frac{1}{2}$ 包

8才以上11才未満..... 1回 $\frac{1}{4}$ 包

5才以上8才未満..... 1回 $\frac{1}{8}$ 包

3才以上5才未満..... 1回 $\frac{1}{8}$ 包

1日3回、白湯または水にて服用する。

注意 (1)服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。

(2)服用に際しては説明文書をよく読むこと。

(3)直射日光の当たらない涼しい所に保管。

(4)配置期限経過後は服用しないこと。

3包(1包1g)入

¥450.

製造発売元 大和中央製薬株式会社 奈良県橿原市北八木町1丁目6-16号

TEL 0744 (22) 2043

⚠️ フスチン顆粒の使用上の注意 ⑱

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある。)

相談すること

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
裏面へつづく

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
便秘、口のかわき

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)