

たんを伴う

湿性のせきに

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

120mL

喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせきに

第2類医薬品

フストールシロップA

トリメトキノール塩酸塩水和物配合

1. 「たん」が出づらくて「せき」の出る方に

フストールシロップAは去痰剤としての性格が強く、「たん」を伴う「湿性のせき」に効力を発揮します。気管支筋に強い選択性を有するトリメトキノール塩酸塩水和物(気管支拡張剤)の配合により気道を確保し、舌咽神経を介して反射的に気道分泌を促し、「たん」の切れをよくするセネガを配合しています。

2. 「喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき」で、中枢性鎮咳剤を使えない方の「せき止め」に

気管支筋に強い選択性を有するトリメトキノール塩酸塩水和物(気管支拡張剤)の配合により気道を確保し、「せき」を軽減し、「喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき」に基づく諸症状をやわらげます。

また、各種アレルギー性疾患の予防・治療に効果のあるクロルフェニラミンマレイン酸塩の配合によりアレルギー性の「せき」、「喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき」に効果があります。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人：高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕 本品60mL中

トリメトキノール塩酸塩水和物……………6mg セネガ流エキス……………1mL
クロルフェニラミンマレイン酸塩…12mg

添加物として、エデト酸Na、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、パラベン、安息香酸Na、香料、赤色102号を含有しています。

〔効能・効果〕

せき、喘鳴（ぜーぜー、ひゅーひゅー）をともなうせき、たん

〔用法・用量〕

下記の1回量を添付の計量コップにとり、1日4回毎食後及び就寝前に服用してください。
なお、場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用しても差し支えありません。

年 令	1 回 量
成 人（15才以上）	10mL
11才以上～15才未満	6.6mL
8才以上～11才未満	5mL
5才以上～ 8才未満	3.3mL
3才以上～ 5才未満	2.5mL
1才以上～ 3才未満	2mL
3ヵ月以上～ 1才未満	1mL

- (1) 本剤は劇薬に該当する成分も含まれていますので、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳児には、医師の診療を受けることを優先し、やむを得ない場合のみ、服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4) 計量コップは使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

〔包 装〕

120mL（計量コップ添付）

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金（祝日を除く）
9：00～17：00

製造販売元  **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地