



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。




# ベンザブロックトローチ

## 鎮咳去たん薬のトローチ剤

### 特徴

第2類医薬品

- 口腔内殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水和物を配合したトローチ剤であり、のどの炎症によるのどのハシ・痛みを抑えます。
- 鎮咳成分・デキストロメトルファンフェノールフタリン塩が咳中枢にはたらい、つらい咳を抑えます。
- 緑茶末(矯味剤)をはじめて配合した、緑色ドーナツ状のトローチ剤です。
- 5歳のお子様からご家族みんなで服用できます。



### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他の鎮咳去たん薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗り物酔い用薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)、鎮静薬



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。  
高熱

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

#### 3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

### 効能

せき、たん、  
のどの炎症によるのどのはれ・のどの痛み・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

(裏面へ続く)

## 用法・用量

次の量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数	服用間隔
11歳以上	1錠	6回	2時間以上
8歳～10歳		4回	4時間以上
5歳～7歳		3回	
5歳未満	服用しないこと		



### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。
- (3) トローチの取り出し方

図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。

(誤ってそのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)




## 成分 6錠(11歳以上の1日服用量)中

はたらき	成分	含量
せき、たん、 のどの炎症によるのどの はれ・のどの痛み	デキストロメトルファンフェノールフタリン塩	60mg
	グアヤコールスルホン酸カリウム	140mg
	セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物：ブドウ糖、緑茶末、銅クロロフィリンNa、硬化油、ステアリン酸Mg、ハッカ油、  
l-メントール、デキストリン、アラビアゴム、香料、オクテニルコハク酸  
デンプンナトリウム、エタノール、バニリン、白糖

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に箱に入れて保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5) 箱の「開封年月日」記入欄に、内袋(アルミの袋)を開封した日付を記入すること。
- (6) 一度内袋(アルミの袋)を開封した後は、品質保持の点から開封日より1ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。
- (7) 内袋(アルミの袋)の中の乾燥剤は服用しないこと。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田コンシューマーヘルスケア株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087  
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

なお、タケダ健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

タケダ健康サイト

検索

<http://takeda-kenko.jp>

製造販売元  武田コンシューマーヘルスケア株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号