

鎮咳去痰薬

生薬配合

第2類医薬品

宇津こどもせきどめ

小さなお子さまにとって、せきが長く続くことは、睡眠や食事などの妨げになり、体力の消耗にもつながります。宇津こどもせきどめは、すぐれた成分に生薬をプラスした、のみやすい顆粒の鎮咳去痰薬です。

特 長

- 1 非麻薬性の鎮咳剤・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物を配合したお子さま用のせきどめです。
- 2 のどのはれ・痛み、たんの排出に効果的に働くカンゾウとキキョウを配合しました。
- 3 小さなお子さまでも服用しやすいように、のみやすい味の顆粒にしました。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬に定められた注意事項として成人が服用される際のことも記載しております。

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状がある人。
高熱、排尿困難
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

(裏面も必ずお読みください)

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】

1日量(3包)中

(1包：1,000mg)

成分	分量	作用
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	20mg	せきの中枢に働いて、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	25mg	気管支に働いてせきをしずめ、痰の排出を助けます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	アレルギー性のせきをしずめます。
カンゾウ粗エキス (原生薬換算量 210mg)	42mg	のどのはれをしずめて痛みをやわらげ、痰をうすめて排出しやすくします。
キョウエエキス (原生薬換算量 180mg)	18mg	

添加物として、乳糖、D-マンニトール、白糖、シクロデキストリン、サッカリンナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、デンプン部分加水分解物を含有します。

【効能】

せき、たん

【用法・用量】

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
1才以上3才未満	1/2包	3回
3才以上5才未満	2/3包	
5才以上8才未満	1包	
1才未満	服用させないこと	

- 定められた用法及び用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 1包を分割した残りを服用させる場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用させてください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

問い合わせ先 宇津救命丸株式会社 お客様相談室

電話 03(3295)2681 受付時間/平日9:00～17:00

製造販売元 宇津救命丸株式会社高根沢工場 〒329-1224 栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢3987