

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 生薬去痰成分配合の鎮咳去痰薬 改源咳止液W

第②類医薬品

### 特 徴

かぜなどで“せき”が出るとき、多くの場合“たん”を伴いますが、これを排出するために体力を消耗し、また睡眠もさまたげられます。

改源咳止液Wは、“せき”をしずめる成分に加え、“たん”を伴うせきによく効く生薬去痰成分のキョウ流エキス、セネガ流エキス配合の服用しやすい液剤です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4. 過量服用・長期連用しないでください



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- \* (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
* 呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

せき・たん



## 用法・用量

次の1回量を1日3～4回服用してください。ただし、症状によっては、1日5～6回まで服用してもよいが、この場合には約4時間の間隔をおいてください。

年齢	15才以上	11才以上 ～15才未満	8才以上 ～11才未満	5才以上 ～8才未満	1才以上 ～5才未満	3か月以上 ～1才未満	3か月未満
1回量	10 mL	6 mL	5 mL	3 mL	2 mL	1 mL	服用させないでください

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
  - (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- \* (3) 12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。

## 成分・分量

60mL中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	作用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢に働いてせきをしずめます。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	一般的に多いアレルギーが原因のせきに有効に作用します。
無水カフェイン	150mg	せきによる不快感を和らげて気分をそう快にします。
キキョウ流エキス (キキョウとして1970mg)	2000mg	共に生薬去痰成分で、これらに含まれる主成分のサポニンが、気管支を刺激して反射的に粘液の分泌を促し、粘稠なたんをうすめて流動をよくし、たんを出しやすくします。
セネガ流エキス (セネガとして1015mg)	1000mg	

●添加物としてクエン酸水和物、クエン酸Na水和物、白糖、高果糖液糖、パラベン、安息香酸Na、カラメル、エタノール、エチルバニリン、バニリン、香料を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用後は、汚染を防ぐため、ピンのフタをよくしめてください。
- (5) 本剤は、生薬エキスを配合していますので、わずかな濁りを生ずることもありますが、効果には変わりありませんので、よく振ってからご使用ください。
- (6) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911  
受付時間：9:00～17:00 (土曜、日曜、祝日を除く)