

丹 陽 印

登録



商標

第2類医薬品

日本薬局方

# 吉見カンゾウ 500g

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)  
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 高齢者
  - 次の症状のある人 高熱、むくみ
  - 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診断をうけてください

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能又は効果

激しいせき、咽喉痛の緩解

### 用法及び用量

成人(15歳以上)は1日量5gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮詰め、かすをこして取り去り、食前又は食間3回に分服してください。

### 保管及び取扱い上の注意


- 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17

電話 06(6941)7164

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html  
電話 0120-149-931 フリーダイヤル



4 951225 320571 14切