

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

鎮咳去痰薬

第②類医薬品

小児用ヒストミンせき止めシロップS

小児用ヒストミンせき止めシロップSは、お子様が服用しやすいシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意

○本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------|---|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能 せき、たん

用法・用量

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|----------|------|--|
| 8才～10才 | 10mL | 1日3回食後および必要な場合には就寝前に服用してください。また、約4時間の間隔をおいていただければ1日6回まで服用できます。 (添付の目盛付コップではかり服用してください。) |
| 5才～7才 | 6mL | |
| 3才～4才 | 5mL | |
| 1才～2才 | 4mL | |
| 3ヵ月～11ヵ月 | 2mL | |
| 3ヵ月未満 | | 服用しないでください。 |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)11才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。
- (4)本剤は生葉エキスを含有していますので、沈でんを生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

成分・分量 60mL中

| 成分名 | 分量 | 作用 |
|-----------------|-------------------------|---|
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 15mg | せき中枢に作用して、せきをしめます。 |
| グアイフェネシン | 150mg | 気道粘膜の分泌を促進して、粘稠なたんをうすめて出しやすくします。 |
| 無水カフェイン | 30mg | 眠気を防ぎます。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 37.5mg | 気管支を拡張して、せきをやわらげ、たんの排出を助けます。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 6mg | 抗ヒスタミン剤。アレルギー性のせきに効果があります。 |
| キキョウ流エキス | 0.6mL (キキョウ600mgに相当) | サポニン系の去痰生葉です。気道の分泌物を増加させるとともに、纖毛運動を活発にしてたんの排出を助けます。 |

添加物：白糖、アルコール、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレンジリコール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)服用後は、瓶のフタをよくしめてください。しめ方が悪いと内容液がもれたり、汚染したりすることがありますので注意してください。
- (5)添付の目盛付コップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (6)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：058-278-3933

受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

■ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地