

浅田飴せきどめシロップ

シュガーレス



- お子様から大人のせきどめ
- リゾチーム塩酸塩配合
- 発作性のせきやたんがからまるせきに効果的
- ストロベリー味



せきは、かぜ等のとき、気道にたまった異物や分泌物を排出するための生理的防御反応です。しかし、激しいせき、長引くせきはのどや気管支の粘膜を痛めるばかりでなく、睡眠をさまたげ体力を消耗させるため、しばしば病気の回復を遅らせます。

浅田飴せきどめシロップは、せきを鎮め、たんの出をよくする成分を配合していますので、激しい発作性のせきやたんがからまるせきに有効で、苦しいせきを効果的に鎮めます。また、甘味剤として砂糖よりカロリーの少ない還元麦芽糖水アメを使用しているシュガーレスのシロップ剤です。サッパリとした甘みとストロベリー味で飲みやすいお薬です。

⚠️ ご使用上の注意

⊗ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。]

1. 過量服用・長期連用しないでください。(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。)
2. 次の人は服用しないでください。
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人
3. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
4. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)



🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 乳児(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告がある。)
 - (4) 授乳中の人
 - (5) 高齢者
 - (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人 高熱、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
便秘、口のかわき

効能・効果

せき、たん



用法・用量

次の量を付属の目盛りつき計量カップではかり、服用してください。
いずれも1日3回毎食後、及び必要な場合には就寝前に服用してください。
また、場合により約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用することができます。

年齢	1回量
大人(15才以上)	10ml
11才以上15才未満	6ml
8才以上11才未満	5ml
5才以上8才未満	3ml
3才以上5才未満	2.5ml
1才以上3才未満	2ml
3ヵ月以上1才未満	1ml
3ヵ月未満	服用しないこと

ちゃんとはかってね



- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

60ml中

成分	分量	作用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に作用し、せきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張し、せきを鎮めます。
クロルフェニランミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきに効果をあらわします。
無水カフェイン	90mg	大脳皮質に作用し、眠気を防ぎます。
リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)	からまるたんを分解し、出しやすくします。
セネガ流エキス	0.5ml (セネガ500mgに相当)	気道粘液の分泌を亢進させ、たんをうすめ、出しやすくします。

添加物として還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、パラベン、エタノール、香料含有

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4) いったん開栓後は、品質保持の点からなるべく早くご使用ください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 服用後はビンの口をよく拭いてからキャップをしっかりと締めてください。
- (7) キャップが開けにくい場合は、キャップ部分をお湯で温めると開けやすくなります。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、
お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社浅田館 お客様相談室

電話 ● 03-3953-4044 (ダイヤルイン)

時間 ● 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)



副作用救済制度は、医薬品を正しく使用したにもかかわらず、入院を必要とする程度の副作用が生じた場合に医療費等の救済給付が行われる制度です。

株式会社 浅田館

発売元 東京都東村山市久米川町5-29-7

日野薬品工業株式会社

製造販売元 滋賀県蒲生郡日野町上野田119