

のどの殺菌・消毒
口臭の除去に

効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去。

用法・用量

1回5～6滴（約0.25mL）をコップ半量の水（約100mL）に滴下し、よくかきまぜた後、うがいをします。1日数回。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤はうがいにのみ使用してください。

成分・分量 本品100g中
クロルヘキシジングルコン酸塩液…2.0g
L-メントール……………1.5g
チョウジ油……………0.2g
添加物としてプロピレングリコール、サッカリンナトリウム水和物、青色1号を含有する。

製造販売元（お問い合わせ先）

昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1丁目4番12号
電話 06-6996-5111（代表）
受付時間：9時から17時まで
（土、日、祝日を除く）

新エスベナン うがい薬



30mL

第2類医薬品

300Asa1207

製造番号

使用期限



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は使用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジングルコン酸塩によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)口の中に傷やひどいただれのある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)使用に際してはこの箱の記載事項をよくお読みください。
- (2)直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度

☎0120-149-931

発売元



白石薬品株式会社
大阪府茨木市五日市1丁目10番33号