



45.0

45.0



医薬品

使用に際してこの説明をよくお読み下さい。また必要に応じて読めるよう大切に保管して下さい。

【使用上の注意】


相対すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊娠又は妊産していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。このアレルギーは家族がアレルギー症状を起こしたことがある人である人。
 - (5) 口の症状のある人。
 - (6) 口の診断を受けた人。
 - (7) 次の診断を受けた人。
 - (1) 虫歯
 - (2) 歯肉炎
 - (3) 歯周炎
 - (4) 歯肉腫
 - (5) 歯肉腫瘍
 - (6) 歯肉がん
 - (7) 歯肉がん前駆症
 - (8) 歯肉がん
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
口	あれしみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

2. それに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	顔面しきびびれ、じんましん、発疹等があらわれる。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません。



日本薬局方

複方ヨーグルト

60mL

【効能・効果】

のどの殺菌、消毒

【用法・用量】

迅速、適量を患部に塗布する。

- ＜用法・用量に關連する注意＞
- (1) 用法・用量を厳守すること。
 - (2) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意すること。保護者の指導監督のもとに使用すること。
 - (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること。
 - (4) 目に入らなように注意すること。入る場合は、早急で眼科医の診療を受けること。
 - (5) 塗布用のみ使用し、内服しないこと。
 - (6) 薬液や薬液をしみこませた綿等を閉つておくと、目に入らなように注意すること。

【成分・分量】

ヨウ素1.2mV/V%、塗料7エーJH0.5mV/V%、グリセリン90v/v%を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】




- (1) 直射日光、当たらずに保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)



C501

製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽市江吉良町1-5-9-3

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪府豊見区今津中2-4-2



96.0

APP.MA

0555007060

初校 H17.7.16

コパイ

カキ

水性7°LS

水性7°LSは0555V0520027と兼用