

止瀉薬

下痢・食あたり・水あたりに

スメクタデスミン®

スメクタデスミンは…

主に地中海原産の天然ケイ酸アルミニウムを配合し、腸内において有害物質などを吸着することで、下痢・食あたり・水あたりに効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - 高齢者。
 - 次の診断を受けた人。
腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
5～6日間服用しても症状がよくなる場合



〔効 能〕

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

〔用法・用量〕

下記の1回服用量をそのまま服用するか、コップ半分の水に入れ、よくかき混ぜて服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回を限度とします
11～14才	$\frac{2}{3}$ 包	
11才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量と働き〕 1包(3.76g)中

成 分	分 量	働 き
天然ケイ酸アルミニウム	3,000mg	腸内において有害物質などを吸着することで下痢、食あたり、水あたりに効果をあらわします。

添加物として、サッカリンNa、ブドウ糖、香料(バニリン)を含有します。

●保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元(輸入) 佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

Manufactured by and under license from

IPSEN

Made in France