



ドルタック®液

第2類医薬品

開け口

この箱は本剤とともに保管し、服用の際はよくお読みください。

▲使用上の注意

相談すること

1. 次の方は購入時に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起したことがある方。
2. 服用後、皮膚に発疹又は消化器に軟便等の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
3. しばらく服用しても症状の改善がみられない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製販売元

スノーデン株式会社
東京都千代田区岩本町3-7-16

本製品についてのお問い合わせ先

お客様相談室
電話 03-3866-2459
受付時間 8:50~12:00
13:00~17:30
(土・日・祝は除く)

プラセンタ製剤

肉体的疲労の栄養補給に
ドルタック®液
プラセンタエキス

ビタミンB2・B6配合

第2類医薬品 20mL

DOLL-TACK
ORAL-SOLUTION

プラセンタ製剤

滋養強壮・虚弱体質に
ドルタック®液
プラセンタエキス

ビタミンB2・B6配合

第2類医薬品 20mL

【成分・分量】本品1瓶(20mL)中
絨毛組織加水分解物……………480mg
(プラセンタエキスとして1600mg)
リポフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル)
……………4mg
ピロキシリン塩酸塩(ビタミンB₆)
……………5mg

※添加物として、白糖、還元麦芽糖水アメ、dl-リンゴ酸、安息香酸Na、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、ポリソルベート80、香料を含有します。

<成分・分量に関連する注意>

- (1) 本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。
- (2) 本剤は生薬成分を配合していますので、まれに沈殿または浮遊を生じることがありますが、薬効に変わりはありません。

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1瓶(20mL)を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。15歳未満は服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) よく振ってから服用してください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度の
お問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhinai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



4 987433 120016