


二日酔のむかつき・飲み過ぎ・食欲不振

# ストーゼ胃腸内服液

生薬配合



第2類医薬品

30mL×2

第2類医薬品

## ストーゼ胃腸内服液

【成分・分量】1日量(2瓶・60mL)中  
ウイキョウ流エキス……0.25mL  
(原生薬換算量250mg)  
キジツエキス……180mg  
(原生薬換算量900mg)  
ゲンチアナ流エキス……0.3mL  
(原生薬換算量300mg)  
ショウキョウ流エキス……0.35mL  
(原生薬換算量350mg)  
ソウジュツ流エキス……0.6mL  
(原生薬換算量600mg)  
ニンジンエキス……35mg  
(原生薬換算量507.5mg)  
エンゴサク流エキス……0.8mL  
(原生薬換算量800mg)  
カルニチン塩化物……300mg  
添加物として白糖、エタノール、トメントール、安息香酸ナトリウムを含有します。

### 【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やげ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

発売元  
富山薬品株式会社  
富山県富山市四方面岩瀬石灘175

第2類医薬品

製造番号

使用期限

生薬配合


二日酔のむかつき・飲み過ぎ・食欲不振

# ストーゼ胃腸内服液

二日酔のむかつき・飲み過ぎ・食欲不振

# ストーゼ胃腸内服液

生薬配合



第2類医薬品

30mL×2

### 【用法・用量】

成人(15才以上)1回1瓶(30mL)を1日2回服用。服用間隔は4時間以上おくと。  
※15才未満は服用しないでください。  
○用法・用量を厳守してください。

### 【使用上の注意】

#### 相対すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
・医師の治療を受けている人。
- 2週間位服用しても症状がよくなる見込みがない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤は生薬成分を含むため、まれに沈降を生じることがありますが、品質には影響ありませんのでよく攪ってから服用してください。

### 副作用被害救済制度

☎0120-149-931

製造販売元  
会名会社 東宝製薬  
岐阜市外ノ瀬3丁目45番地  
岐阜県岐阜市 TEL:058-251-6888  
(9:00~16:00 祝日を除く)

P-87A-47

