

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
承認販売名	
製品名	エンカセブン
製品名(読み)	エンカセブン
製品の特徴	
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)</p> <p>1. 次の人は服用しないこと (1)本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してせんそくを起こしたことがある人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないこと</p> <p>6. 長期連用しないこと</p> <p>■相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。 (3)乳児(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告がある。). (4)高齢者。 (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6)次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (7)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があ</p>

るので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[関係部位：症状]

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振

精神神経系：めまい

泌尿器：排尿困難

その他：過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

[症状の名称：症状]

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害：発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があわわれる。

再生不良性貧血：青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。

無顆粒球症：突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

呼吸抑制：息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB2）により、尿が黄色くなることがあります。

効能・効果	かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
効能関連注意	

用法・用量	いずれも、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。 15歳以上:1回:1包 11歳以上15歳未満:1回:2／3包 7歳以上11歳未満:1回:1／2包 3歳以上7歳未満:1回:1／3包 1歳以上3歳未満:1回:1／4包 1歳未満:服用しないこと																								
用法関連注意	(1)用法及び用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。																								
成分分量	3包中 <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th><th>分量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td><td>900mg</td></tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td><td>7.5mg</td></tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td><td>24mg</td></tr> <tr> <td>ノスカピン</td><td>48mg</td></tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td><td>60mg</td></tr> <tr> <td>グアヤコールスルホン酸カリウム</td><td>240mg</td></tr> <tr> <td>無水カフェイン</td><td>75mg</td></tr> <tr> <td>チアミンジスルフィド</td><td>24mg</td></tr> <tr> <td>リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)</td><td>60mg(力価)</td></tr> <tr> <td>リボフラビン</td><td>12mg</td></tr> <tr> <td>ゴオウ</td><td>3mg</td></tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	ノスカピン	48mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	無水カフェイン	75mg	チアミンジスルフィド	24mg	リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)	60mg(力価)	リボフラビン	12mg	ゴオウ	3mg
成分	分量																								
アセトアミノフェン	900mg																								
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg																								
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg																								
ノスカピン	48mg																								
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg																								
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg																								
無水カフェイン	75mg																								
チアミンジスルフィド	24mg																								
リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)	60mg(力価)																								
リボフラビン	12mg																								
ゴオウ	3mg																								
添加物	バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミニ酸マグネシウム、グリチルリチン酸二カリウム、香料																								
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。) (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。 (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。																								
消費者相談窓口	会社名:大協薬品工業株式会社 問い合わせ先:お客様相談窓口 電話:076-479-1313(土、日、祝日を除く) 受付時間:9:00~17:00																								
製造販売会社	大協薬品工業(株) 添付文書情報 会社名:大協薬品工業株式会社 住所:富山市水橋畠等173																								
販売会社																									
剤形	散剤																								

