

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
承認販売名	
製品名	かわかみんかぜ
製品名(読み)	カワカミンカゼ
製品の特徴	
使用上の注意	<p><b>■してはいけないこと</b> (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次の人は服用しないこと             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</li> </ul> </li> <li>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと             <ul style="list-style-type: none"> <li>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</li> </ul> </li> <li>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)</li> <li>4. 授乳中は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること</li> <li>5. 服用前後は飲酒しないこと</li> <li>6. 長期連用しないこと</li> </ol> <p><b>■相談すること</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。</li> <li>(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>(3)乳児(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用したときに、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告がある。)</li> <li>(4)高齢者。</li> <li>(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>(6)次の症状のある人。 高熱、排尿困難</li> <li>(7)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</li> </ul> </li> <li>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があ</li> </ol>

るので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[関係部位:症状]

皮膚:発疹・発赤, かゆみ  
消化器:吐き気・嘔吐, 食欲不振  
精神神経系:めまい  
泌尿器:排尿困難  
その他:過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

[症状の名称:症状]

ショック(アナフィラキシー):服用後すぐに、皮膚のかゆみ, じんましん, 声のかすれ, くしゃみ, のどのかゆみ, 息苦しさ, 動悸, 意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群), 中毒性表皮壊死融解症, 急性汎発性発疹性膿疱症:高熱, 目の充血, 目やに, 唇のただれ, のどの痛み, 皮膚の広範囲の発疹・発赤, 赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る, 全身がだるい, 食欲がない等が持続したり, 急激に悪化する。

肝機能障害:発熱, かゆみ, 黄疸(皮ふや白目が黄色くなる), 褐色尿, 全身のだるさ, 食欲不振等があらわれる。

腎障害:発熱, 発疹, 尿量の減少, 全身のむくみ, 全身のだるさ, 関節痛(節々が痛む), 下痢等があらわれる。

間質性肺炎:階段を上ったり, 少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる, 空せき, 発熱等がみられ, これらが急にあらわれたり, 持続したりする。

ぜんそく:息をするとゼーゼー, ヒューヒューと鳴る, 息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血:青あざ, 鼻血, 歯ぐきの出血, 発熱, 皮膚や粘膜が青白くみえる, 疲労感, 動悸, 息切れ, 気分が悪くなりくらっとする, 血尿等があらわれる。

無顆粒球症:突然の高熱, さむけ, のどの痛み等があらわれる。

呼吸抑制:息切れ, 息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後, 次の症状があらわれることがあるので, このような症状の持続又は増強がみられた場合には, 服用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

便秘, 口のかわき, 眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

**その他の注意**

本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB2)により, 尿が黄色くなる場合があります。

**効能・効果**

かぜの諸症状(鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, のどの痛み, せき, たん, 悪寒, 発熱, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和

**効能関連注意**

用法・用量	<p>いずれも、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。</p> <p>15歳以上：1回：1包  11歳以上15歳未満：1回：2／3包  7歳以上11歳未満：1回：1／2包  3歳以上7歳未満：1回：1／3包  1歳以上3歳未満：1回：1／4包  1歳未満：服用しないこと</p>																								
用法関連注意	<p>(1)用法及び用量を厳守してください。</p> <p>(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p> <p>(3)12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。</p>																								
成分分量	<p>3包中</p> <table border="1" data-bbox="560 647 1235 1211"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>900mg</td> </tr> <tr> <td>マレイン酸クロルフェニラミン</td> <td>7.5mg</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>24mg</td> </tr> <tr> <td>ノスカピン</td> <td>48mg</td> </tr> <tr> <td>dl-塩酸メチルエフェドリン</td> <td>60mg</td> </tr> <tr> <td>グアヤコールスルホン酸カリウム</td> <td>240mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>75mg</td> </tr> <tr> <td>チアミンジスルフィド</td> <td>24mg</td> </tr> <tr> <td>塩化リゾチーム(リゾチームとして)</td> <td>60mg(力価)</td> </tr> <tr> <td>リボフラビン</td> <td>12mg</td> </tr> <tr> <td>ゴオウ</td> <td>3mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900mg	マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	ノスカピン	48mg	dl-塩酸メチルエフェドリン	60mg	グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	無水カフェイン	75mg	チアミンジスルフィド	24mg	塩化リゾチーム(リゾチームとして)	60mg(力価)	リボフラビン	12mg	ゴオウ	3mg
成分	分量																								
アセトアミノフェン	900mg																								
マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg																								
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg																								
ノスカピン	48mg																								
dl-塩酸メチルエフェドリン	60mg																								
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg																								
無水カフェイン	75mg																								
チアミンジスルフィド	24mg																								
塩化リゾチーム(リゾチームとして)	60mg(力価)																								
リボフラビン	12mg																								
ゴオウ	3mg																								
添加物	<p>バレイシヨデンブン、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、グリチルリチン酸二カリウム、香料</p>																								
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2)小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)</p> <p>(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。</p> <p>(5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。</p>																								
消費者相談窓口	<p>会社名：大協薬品工業株式会社  問い合わせ先：お客様相談窓口  電話：076-479-1313  受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)</p>																								
製造販売会社	<p>大協薬品工業(株) <a href="#">添付文書情報</a>  会社名：大協薬品工業株式会社  住所：富山市水橋畠等173</p>																								
販売会社	<p>河上薬品商事(株) <a href="#">添付文書情報</a></p>																								
剤形	<p>散剤</p>																								

