

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包
61

桃核承気湯「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠

漢方薬 桃核承氣湯「タキザワ」

14L

△<使用上の注意>

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



【相談すること】

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 医師の治療を受けている人
- 妊娠又は妊娠していると思われる人
- 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 高齢者
- 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の症状のある人
むくみ
- 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドス	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や
テロン症、 ミオパチー	こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢

- 1ヵ月位（便秘に服用する場合には5~6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

トウニン.....5.0g 鹿茸粉ナトリウム.....1.0g
ケイヒ.....4.0g カンゾウ.....1.5g
ダイオウ.....3.0g

1日分（1包7.25g×2）14.5g

【効能・効果】

体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲症

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量くらいまで煎じ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回 量
大人（15歳以上）	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満	服用しないこと

【用法・用量に関する注意】

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 110985



製造販売元
株式会社タキザワ漢方薬
さいたま市見沼区片柳412-1
お客様相談室☎048-688-7923
受付時間:9時~18時(月~金)

タキザワ漢方

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

■ 0120-149-931

