

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包  
55

麻杏甘石湯「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠

# 漢方薬 麻杏甘石湯 「タキザワ」

15D

## △<使用上の注意>

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 次の症状のある人  
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドス テロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】	
マ オ ウ	4.0 g
カ ネ ゾ ウ	2.0 g
キ ョウニン	4.0 g
セ ッ コ ウ	10.0 g
1日分 (1包10.0g×2)	20.0 g

### 【効能・効果】

体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症：せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み

### 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人（15歳以上）	全量
15歳未満 7歳以上	大人の2/3
7歳未満 4歳以上	大人の1/2
4歳未満 2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 110978

製造販売元  
株式会社 タキザワ漢方  
さいたま市見沼区片柳412-1  
お客様相談室☎048-688-7923  
受付時間:9時～18時(月～金)

タキザワ漢方

換気

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

0120-149-931

