

ローレン ミコナ液 (水虫・たむし用薬)

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

第2類医薬品

水虫・たむしは、白癬菌というカビが皮膚の角質層等に寄生して起こる皮膚病で、かゆみや痛みを伴うことが多くあります。ローレンミコナ液は、有効成分のはたらきにより白癬菌を殺菌し、水虫・たむしによる不快な症状を改善します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (5) 患部が化膿している人。
- (6) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、乾燥・つっぱり感、水疱、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1～2回、適量を患部に塗布してください。


〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、ただちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

裏面もお読みください。

〈容器の使用法〉

- 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2～3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)
- 使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます。)



【成分・分量】

成分	100mL中	はたらき
ミコナゾール硝酸塩	1.0g	白癬菌を殺菌します。
クロタミトン	10.0g	患部のかゆみをおさえます。
リドカイン	2.0g	患部のかゆみをおさえ、痛みを鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.5g	患部の炎症を改善します。
l-メントール	1.0g	清涼感を与え、患部の炎症をやわらげます。

添加物として、プロピレングリコール、エタノール、セバシン酸ジエチルを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)火気に近づけたり、火の中に入れてしないでください。また、使用済みの容器は火中に投げないでください。
- (5)合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、床や家具等につかないようにしてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

水虫治療のポイント

- 患部はいつも清潔にしてください。靴下や靴等も清潔なものを使用してください。
- 白癬菌の寄生は、症状のあらわれている範囲より広がっていることが多いため、薬剤は広めに塗布してください。
- かゆみ等がなくなっても、再発することがあるためしばらくの間は根気よく治療を続けてください。
- 患部のむれを防ぎ、乾燥に心がけてください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)

発売元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142