

服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう保管して下さい。

胸やけ・むかつき・胃痛をクールにしずめる 胃腸薬 第2類医薬品

パシロン[®] クール NOW[®]

水なしでクールに胃の不快感を
スッとしずめる爽快クール胃腸薬です。

- 4種の制酸剤と2種の胃粘膜修復剤が、仕事の疲れや不規則な生活で荒れた胃粘膜を正常な状態に戻し、空腹時の胃痛・胸やけ・ムカムカによく効きます。
- チュアブル錠なので、口中でかみくだくと有効成分がじわじわと食道を通過して胃に達します。そのため、「胸やけ」の原因となる胃の上部の荒れた胃粘膜に対して直接かつ効果的に作用します。



1 かみくだくと有効成分が
じわじわと食道を通過して



2 胸やけの原因となる胃の
上部の荒れた胃粘膜に



3 直接・効果的に作用します

- 水なしで服用できる爽やかなクールミント味のチュアブル錠でスッキリします。



【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないで下さい。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることもある)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
口のかわき
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

その他の注意 母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃痛、胸やけ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、胃部不快感、胃酸過多、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)

用法・用量

次の量を食前または食間の空腹時にかみくだくか、または口中でとがして服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1錠	3回
15才未満	服用しないこと	

*食間とは・・・食後2～3時間をさします。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) チュアブル錠の取り出し方

図のようにチュアブル錠のはいつているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



有効成分と作用 (3錠中)

	有効成分	配合量	作用
胃粘膜修復剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)	6mg	消炎作用を有するカミツレという薬用植物由来の成分で、胃粘膜に直接作用して炎症をしずめます。
	アルジオキサ	150mg	胃粘膜の傷んだ部位に直接作用して修復・保護し胸やけ・胃痛に効果的です。
制酸剤	水酸化マグネシウム	450mg	過剰な胃酸をすばやく中和し、不快な症状を効果的に改善します。
	沈降炭酸カルシウム	900mg	
	合成ヒドロタルサイト	780mg	過剰な胃酸を持続的に中和しながら、胃粘膜を保護し胸やけ・胃痛に効果的です。
	ロートエキス	30mg	胃酸分泌抑制作用があり、胃の痛みにも効果的です。

●添加物：キシリトール、白糖、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg、 β -メントール、香料

●本剤のうすい紫色は、有効成分の水溶性アズレンによるものであり、着色料等は一切使用していません。

保管及び取扱上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないで下さい。

なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後は、なるべく早くご使用下さい。

お問い合わせ先:ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

販売元

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

製造販売元

クオリテックファーマ株式会社
静岡県掛川市上土方工業団地29-27