

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



ストッパ胃腸薬

第2類医薬品

口の中で溶かし、水なしでのめるため、通勤中、仕事中等どどんな場所でものむことができます。
胃のむかつき、胃痛などに、口で溶けた有効成分が胃の入口から効いていきます。

こんな時のむかつき、胃痛などに、水なし錠で効きます。



通勤途中のむかつき



仕事中の胃痛



運転中の胃もたれ



食後の胸やけ

すぐれた効きめ

3つの作用で、胃のむかつき・胃痛などを抑えます。

荒れた胃粘膜を修復、保護

胃のはたらきを活発化

過剰な胃酸を中和



すばやく溶ける どこでものめる

口の中ですばやく溶ける
EXPRESS錠。水なしで
サツとのめるから、どんな
シーンでも服用できます。

EXPRESS錠



イメージ図

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください




(必ず裏面もお読みください)

効能

はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、胃痛、胃もたれ、胸やけ、消化不良、飲み過ぎ、食べ過ぎ、食欲不振(食欲減退)、胃酸過多、胃部不快感、胃弱、胃重、胸つかえ、げっぷ、嘔吐、胃部・腹部膨満感

用法・用量

次の量を噛みくだくか、口の中で溶かして服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1錠 	3回
15才未満	服用しないこと X	

〈用法・用量に関連する注意〉

錠剤の取り出し方 図のように錠剤の入っているPTP(包装)シートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分

1日服用量(3錠)中

有効成分	含量	はたらき
アルジオキサ	300mg	荒れた胃粘膜を修復します。
ケイヒ末	402mg	胃のはたらきを活性化させ、弱った胃の調子を整えます。
ウイキョウ末	102mg	
炭酸マグネシウム	150mg	過剰に分泌された胃酸を中和するとともに、荒れた胃粘膜を保護します。
合成ヒドロタルサイト	750mg	

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、エリスリトール、クロスボビドン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、L-メントール、ステアリン酸Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品のため、製品により錠剤の色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■ 眠くなる成分は入っておりません。

お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください。

ライオン株式会社 お客様センター 0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7