

第2類医薬品



漢方煎専科

安中散料

5

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 アキザワ漢方廠


2014年8月(記載要領変更に伴う改訂)

第2類医薬品

漢方薬 安中散料「タキザワ」

17A

△<使用上の注意>



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドス テロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

ケンイヒ	5.0g	シュクシャ	1.5g
エンゴサク	4.0g	カンゾウ	1.5g
ボレイ	4.0g	リョウキョウ	1.0g
ワイキョウ	2.0g		

1日分 (1包9.5g×2) 19.0g

【機能・効果】

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛がある、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量くらいまで煎じめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回 量
大人（15歳以上）	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180377



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方廠
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室 048-688-7923
受付時間：9時～18時（月～金）

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

0120-149-931

