



\*2011年12月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。




# アリナミンEXプラス®

ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>製剤

第3類医薬品

## 特徴

- アリナミンEXプラスは、「タケダ」が開発したビタミンB<sub>1</sub>誘導体 フルスルチアミン、ビタミンB<sub>6</sub>、ビタミンB<sub>12</sub>を配合し、「目の疲れ」「肩こり」「腰の痛み」などのツライ症状にすぐれた効果をあらわします。
- 補酵素（コエンザイムA）となってエネルギーの産生に重要な働きをするパントテン酸カルシウム、体のすみずみの血液循環を改善するビタミンEを配合しています。
- 服用しやすい黄色の糖衣錠です。



## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

軟便、下痢、便秘

#### 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

#### 5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効 能

1. 次の諸症状の緩和  
眼精疲労、筋肉痛・関節痛（肩こり、腰痛、五十肩など）、神経痛、手足のしびれ
2. 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>B<sub>6</sub>B<sub>12</sub>の補給  
肉体疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期

「ただし、上記1の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。」

（裏面へ続く）

## 用法・用量

次の量を、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2～3錠	1回
15歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>  
用法・用量を厳守すること。

## 成分 3錠(1日最大服用量)中

成分	含量
フルスルチアミン(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)として (フルスルチアミン塩酸塩)	100mg 109.16mg)
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	100mg
シアノコバラミン(ビタミンB <sub>12</sub> )	1,500μg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE コハク酸エステルカルシウム) (dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして)	103.58mg 100mg)
パントテン酸カルシウム	30mg
ガンマーオリザノール	10mg

添加物：乳酸カルシウム水和物、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、エリスリトール、ビタミンB<sub>2</sub>、酸化チタン、アラビアゴム、炭酸Ca、タルク、白糖

## 保管および取扱い上の注意

### ビン入り品、分包品について


- (1) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (2) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

### ビン入り品について

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (3) ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (4) 服用のつどビンのフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (5) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。

### 分包品について

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、4日以内に服用すること。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」  
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087  
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号