

# エスタック®総合感冒

エスタック総合感冒は、5才から家族みんなで服用できるファミリーユースの総合かぜ薬です。のどの痛みや発熱によく効く解熱鎮痛剤アセトアミノフェン、鼻みずに効くクロルフェニラミンマレイン酸塩を中心に、ヘスペリジン、カンゾウ、シヨウキョウなどを加え、かぜの11の諸症状にしっかり効くよう処方設計された、のみやすいフィルムコーティング錠です。

## △ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の人は服用しないでください

(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)

#### 4. 服用時は飲酒しないでください

#### 5. 長期連用しないでください

### 📌 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)授乳中の人。(4)高齢者。(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7)次の症状のある人。高熱、排尿困難 (8)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、甲状腺機能障害

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。)
ぜんそく	

(2)5~6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください




口のかわき

## ■ 効能・効果

かぜの諸症状(のどの痛み、鼻水、鼻づまり、発熱、悪寒、頭痛、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## ■ 用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。

年 齢	成人(15才以上)	11才~14才	5才~10才	5才未満
1回量	 3錠	 2錠	 1錠	服用しないこと

### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■ 成 分 9錠(成人1日量)中

アセトアミノフェン ..... 900mg  
 クロルフェニラミンマレイン酸塩 ..... 7.5mg  
 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 ..... 48mg  
 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 ..... 60mg  
 ヘスペリジン ..... 45mg  
 カンゾウエキス(カンゾウ750mgより抽出) ..... 187.5mg  
 ショウキョウ末 ..... 150mg  
 無水カフェイン ..... 75mg

添加物として、クロスCMC-Na、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒプロメロース、ポビドン、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、三二酸化鉄を含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。(5)ビンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。(6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

## ■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>