

エンカセブンカプセルG

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
承認販売名	
製品名	エンカセブンカプセルG
製品名(読み)	エンカセブンカプセルG
製品の特徴	
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)</p> <p>1. 次の人は服用しないこと (1)本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないこと</p> <p>6. 長期連用しないこと</p> <p>■相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p>

[関係部位:症状]
皮膚:発疹・発赤, かゆみ
消化器:吐き気・嘔吐, 食欲不振
精神神経系:めまい
泌尿器:排尿困難
その他:過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

[症状の名称:症状]

ショック(アナフィラキシー):服用後すぐに、皮膚のかゆみ, じんましん, 声のかすれ, くしゃみ, のどのかゆみ, 息苦しさ, 動悸, 意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群), 中毒性表皮壊死融解症, 急性汎発性発疹性膿疱症:高熱, 目の充血, 目やに, 唇のただれ, のどの痛み, 皮膚の広範囲の発疹・発赤, 赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る, 全身がだるい, 食欲がない等が持続したり, 急激に悪化する。

肝機能障害:発熱, かゆみ, 発疹, 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる), 褐色尿, 全身のだるさ, 食欲不振等があらわれる。

腎障害:発熱, 発疹, 尿量の減少, 全身のむくみ, 全身のだるさ, 関節痛(節々が痛む), 下痢等があらわれる。

間質性肺炎:階段を上ったり, 少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる, 空せき, 発熱等がみられ, これらが急にあらわれたり, 持続したりする。

ぜんそく:息をするときゼーゼー, ヒューヒューと鳴る, 息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血:青あざ, 鼻血, 歯ぐきの出血, 発熱, 皮膚や粘膜が青白く見える, 疲労感, 動悸, 息切れ, 気分が悪くなりくらつとする, 血尿等があらわれる。

無顆粒球症:突然の高熱, さむけ, のどの痛み等があらわれる。

呼吸抑制:息切れ, 息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後, 次の症状があらわれることがあるので, このような症状の継続又は増強がみられた場合には, 服用を中止し, 医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

便秘, 口のかわき, 眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB2)により、尿が黄色くなることがあります。

効能・効果	かぜの諸症状(鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, のどの痛み, せき, たん, 悪寒, 発熱, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和
効能関連注意	
用法・用量	いずれも, 1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。 15歳以上:1回:2カプセル 7歳以上15歳未満:1回:1カプセル 7歳未満:服用しないこと

用法関連注意	<p>(1)用法及び用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。 (4)カプセルの取り出し方 カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)</p>																								
成分分量	<p>1日量(6カプセル)中</p> <table border="1" data-bbox="557 512 1256 1073"> <thead> <tr> <th>成分</th><th>分量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td><td>900mg</td></tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td><td>7.5mg</td></tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td><td>24mg</td></tr> <tr> <td>ノスカピン</td><td>48mg</td></tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td><td>60mg</td></tr> <tr> <td>グアヤコールスルホン酸カリウム</td><td>240mg</td></tr> <tr> <td>無水カフェイン</td><td>75mg</td></tr> <tr> <td>チアミンジスルフィド</td><td>24mg</td></tr> <tr> <td>リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)</td><td>60mg(力価)</td></tr> <tr> <td>リボフラビン</td><td>12mg</td></tr> <tr> <td>ゴオウ</td><td>3mg</td></tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	ノスカピン	48mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	無水カフェイン	75mg	チアミンジスルフィド	24mg	リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)	60mg(力価)	リボフラビン	12mg	ゴオウ	3mg
成分	分量																								
アセトアミノフェン	900mg																								
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg																								
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg																								
ノスカピン	48mg																								
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg																								
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg																								
無水カフェイン	75mg																								
チアミンジスルフィド	24mg																								
リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)	60mg(力価)																								
リボフラビン	12mg																								
ゴオウ	3mg																								
添加物	沈降炭酸カルシウム、バレイショデンプン、結晶セルロース、メタケイ酸アルミニウムマグネシウム、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステル																								
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。). (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。</p>																								
消費者相談窓口	会社名:大協薬品工業株式会社 問い合わせ先:お客様相談窓口 電話:076-479-1313(土、日、祝日を除く) 受付時間:9:00~17:00																								
製造販売会社	大協薬品工業(株) 添付文書情報 会社名:大協薬品工業株式会社 住所:富山市水橋畠等173																								
販売会社																									
剤形	カプセル																								
リスク区分等	第「2」類医薬品																								