



ツムラの 滋養強壯剤

ワンテンPα

第2類医薬品

010051-3

ツムラの 滋養強壯剤

ワンテンPα

牛黄・鹿茸・人參・イカリ草・ニンニク・ローヤルゼリー配合



第2類
医薬品

48カプセル(1日2カプセル)



〔成分・分量〕 2カプセル中
 ゴオウ……………2mg イカリ草乾燥エキス……………20mg
 ロクジョウ末……………10mg (インヨウカクとして150mg)
 加工大蒜……………20mg トコフェロール酢酸エステル……………50mg
 (ニンニクとして2000mg)
 ローヤルゼリー末……………50mg フルスルチアミン塩酸塩……………20mg
 シベット散……………5mg (シベットとして0.25mg) リボフラビン酪酸エステル……………12mg
 ハンピ末……………20mg ビリドキシン塩酸塩……………15mg
 カイクジン末……………20mg
 ニンジン乾燥エキス……………60mg (ニンジンとして870mg)

添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、エチルセルロース、ケイ酸Ca、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸Na・青色1号・赤色102号・黄色5号・ゼラチン(カプセル本体)
 (成分・分量に関連する注意)
 本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、これは配合成分のリボフラビン酪酸エステルによるもので、ご心配ありません。

〔内容量〕 48カプセル(6カプセル×8袋) 副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

株式会社ツムラ 東京都港区赤坂2-17-11 千107-8521
 紙 箱 フィルム:P0

お客様相談窓口
 電話 0120-329-930
 http://www.tsumura.co.jp/

製造販売元
 大昭製薬株式会社
 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

使用期限
 製造番号



ツムラの 滋養強壯剤

ワンテンPα

牛黄・鹿茸・人參・イカリ草・ニンニク・ローヤルゼリー配合



第2類
医薬品

48カプセル(1日2カプセル)



〔販売名〕ワンテンPα 第2類医薬品

△【使用上の注意】

- 相談すること
- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 医師の治療を受けている人。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐、口内炎

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 便秘、軟便、下痢。
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕
 滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕
 次の量を、水またはお湯と一緒に必ず服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回
15歳未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕
 (1)定められた用法・用量を守ってください。
 (2)カプセルの取り出し方
 右図のようにカプセルの入っているPTPシート
 の凸部を指先で強く押し裏面のアルミ箔
 を破り、取り出しお飲みください。(誤って
 そのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き
 刺さる等思わぬ事故につながります。)



- 〔保管および取扱い上の注意〕
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - 小児の手の届かない所に保管してください。
 - 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
 - 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。