

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読み下さい。

乗物酔い薬

スカイラブ「内服液」

スカイラブ「内服液」は、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和に効果をあらわす液剤です。携帯しやすいので、旅行の途中で気分が悪くなったときでも、その場で服用できます。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい

就医 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
緑内障



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	動悸、排尿困難

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
口のかわき

成分と作用 本品1本(15mL)中

成 分	分 量	作 用
ジメンヒドリナート	50mg	嘔吐中枢抑制作用により、乗物酔いによるはきけ、嘔吐、めまい等の症状を予防、緩和します。
カフェイン	25mg	脳血管に働き頭痛をしめます。
塩酸ビリドキシン(ビタミンB ₆)	5mg	
ニコチン酸アミド	20mg	消耗しがちなビタミンを補います。

添加物としてグルタミン酸Na、L-メントール、D-ソルビトール、サッカリンNa、白糖、グリチルリチン酸2K、dl-リンゴ酸、コハク酸、クエン酸Na、エタノール、安息香酸Na、パラベン、香料を含有します。

効能又は効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



用法及び用量

次の量を1日3回を限度として服用して下さい。

服用間隔は4時間以上おいて下さい。

ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分前に服用して下さい。

年 齢	大人 (15才以上)	15才未満
1回量	1本	服用しないこと

<用法及び用量に関する注意>

(1) 用法及び用量を厳守して下さい。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

■お問い合わせ先:

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間: 9時から16時30分まで (土、日、祝日を除く)



製造元 伊丹製薬株式会社

本社・工場 滋賀県高島郡今津町大字下弘部280
営業本部 大阪市城東区野江3-21-16