

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なとき
にすぐ読めるように大切に保管してください。

筋肉・関節の痛みに、液剤で手が汚れず早く乾く 第2類医薬品

経皮鎮痛消炎剤

フェイタスローション

微香性

フェイタスローションは、優れた抗炎症・鎮痛効果が認められ
ている「フェルビナク」を主成分(3%配合)とした経皮鎮痛
消炎剤です。

- 「フェルビナク」は痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- L-メントール3.0%配合なので、さわやかな使用感です。
- 持ちやすさと塗りやすさを追求したオリジナルボトル採用なので、手を汚さずに1人でも簡単に肩や首筋に塗布できます。
- 臭いの気にならない微香性なので周囲の人々に気を使わずに使用できます。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 連座、かぶれ、傷口。
- (3) 化膿している患部。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体质の人。
- (3) 間によりアレルギー(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

- (2) 1週間くらい使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、挫傷、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量

1日2~4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法を守ってください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用のみに使用してください。
- (4) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

成分・分量

成 分	含 量(100g中)	働き
フェルピナク	3.0g	炎症を抑え痛みをやわらげます
メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます

添加物としてエタノール、N-メチル-2ピロリドン、トリエタノールアミン、ハーセチルシエチル、ベンジルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンオレオキシプロピレンセチルエーテル、ミリストン酸イソプロピルを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 漂発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めてください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化粧の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

■本商品についてのお問い合わせは、お問い合わせ窓口・販売店、又は下記の当社「お客様相談室」までお願い申し上げます。

販売元  久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥取市田代大宮町408

久光製薬お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1
TEL 0120-133250 受付時間：9:00~12:00, 13:00~17:50(土、日、祝日を除く)

製造販売元 東光薬品工業株式会社 〒129-0865 東京都足立区新田2-16-23