

のびのびサロンシップ® S (販売名)

〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要に応じてすぐ読めるように大切に保管してください。

角が丸いので、シップの端からはがれにくい。

フィルムが簡単に剥がせるから貼りやすい。

全方向に伸縮自在。

薬袋の開け口が広いので取り出しやすい。

開封後、段差がつくから開けやすい。

微香性

使用上の注意

❌してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、骨折痛、しもやけ

用法・用量

1日1~2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)

サリチル酸グリコール…1.25g ビタミンE酢酸エステル…1.00g
ℓ-メントール…1.00g グリチルレチン酸…0.05g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、グリセリン、ケイ酸Al、香料、酸化チタン、ゼラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、その他3成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室: ☎0120-133250

受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:50(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先: (独) 医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

2B363T



このように
押し開けて
ください。



12枚入
サイズ:10cm×14cm
(6枚/1袋×2袋)

のびのびサロンシップ® S

第3類医薬品

微香性

全方向伸縮自在

開けやすい

貼りやすい

取り出し口が広い

丸かどシップ



サイズ:10cm×14cm
(6枚/1袋×2袋)

12枚入

冷感



のびのびサロンシップ® S

肩こり・腰痛

筋肉痛・筋肉疲労・ねんざ