

販売名：ピタグルコンローヤルK

【使用上の注意】【相談すること】

次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。
・しばらく服用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。

・用法及び用量を厳守すること。

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

2000

タウリン2000mg ローヤルゼリー60mg
インヨウカク300mg(原薬換算)配合

ピタグルコンローヤルK

【成分・分量】1日量(1本：100mL)中
イカリソウエキス……………30mg
(インヨウカク300mgに相当)
ローヤルゼリー……………60mg
タウリン……………2000mg
チアミン塩化物塩(ビタミンB₁)……………10mg
リボフラビン(ビタミンB₂)……………2mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……………6mg
ニコチン酸アミド……………20mg
無水カフェイン……………50mg

(アルコール含有0.6mL以下)

添加物としてL-グルタミン酸Na、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、クエン酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料を含有します。

・本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



100mL
¥280+税

製造販売元
Rinyo

金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

ガラス：ビン
金属：キャップ

使用期限

Lot No.

第2類医薬品