

【使用上の注意】



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 深い傷やひどいやけどの人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤・かゆみ

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

使用期限

製造番号



製造販売元


ヤクハン製薬株式会社

北海道北広島市北の里27番地



第3類医薬品

0.1%アクリノール液P 「ヤクハン」 滅菌済



【成分】

本品100mL中、アクリノール0.1gを含みます。

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌、消毒	本剤をそのまま塗布してください。
口腔内の殺菌、消毒	本剤をそのまま又は水で2倍に希釈して含漱してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 衣類に付着すると黄色に着色し、脱色しにくいので注意してください。
- (4) 誤用の原因になったり、品質が変わるものがありますので、他の容器に入れ替えないでください。