

指定医薬部外品



のどの痛み・はれ・あれ・不快感・声がれに コルゲン[®]ウォトローチ



- 効能・効果/のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ・のどのあれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
- 用法・用量/成人(15歳以上)は、1回1個を1日4~5回、小児(5歳以上15歳未満)は、1回1個を1日2~3回、口の中がかまずにできるだけゆっくり溶かして用いる。

製造販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

●保管及び取り扱い上の注意 / (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) PTP のアルミ箔が破れたり、中身のトローチが破損しないように、保管及び携帯に注意すること。(5) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

口腔咽喉薬

指定医薬部外品

販売名：新コルゲン[®]ウォトローチ A

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月~金(祝日を除く)9:00~17:00



この外箱は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

●使用上の注意 / 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬にアレルギー反応がある人。(4) 1回1個を1日4~5回、口の中がかまずにできるだけゆっくり溶かして用いる。 (1) 使用後、次の症状があらわれた場合 反応：発疹・発赤・かゆみ (2) 5~6日間使用しても症状がよくなりません。

年齢	1日服用回数	1個	2~3回
成人(15歳以上)	1個	4~5回	
小児(5歳以上15歳未満)	1個	2~3回	

(用法・用量に関する注意)
 (1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 飲み残しや、のび込んだりしないこと。(4) トローチの取り出し方：下図のようにトローチの入っているPTPシートを破り、取り出して使用する。(誤ってそのままだんごりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)

●成分・分量に関する注意
 本剤には生薬が配合されているので、製品により色が多異なることがある。

成分・分量 (5個中)	含有成分	分量
テナキ乾燥エキス	23.95mg (テナキとして400mg)	のどを潤し、不快感をやわらげる。
セチルピロリジニウム塩化物水和物	5.0mg	口腔内やのどを殺菌・消毒する。
アリルメチルチン酸二カリウム	15.0mg	のどの炎症を抑えて、はれを緩和する。

開け口

