

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

医薬品

総合かぜ薬
ワクナガ
ブジコール錠

フマル酸クレマスチン・塩化リゾチーム配合

製品の特徴

ワクナガブジコール錠は、鼻水・鼻づまりによく効くフマル酸クレマスチン、鼻やのどの炎症をしずめ、たんをきれやすくする塩化リゾチーム、炎症をしずめる作用のある甘草のエキスなど、かぜの諸症状を緩和する8つの成分を配合した総合かぜ薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
- 次の人は服用しないで下さい。
 - 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。(眠気があらわれることがあります。)
 - 服用時は飲酒しないで下さい。
 - 長期連用しないで下さい。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 授乳中の人 (4) 高齢者
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人 (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人 高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診察を受けること。)
ぜんそく	

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

口のかわり

効能・効果

かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、鼻水、くしゃみ、鼻づまり、せき、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

1 回下記量を食後なるべく30分以内に、水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人 (15才以上)	3 錠	3 回
11才以上15才未満	2 錠	
5才以上11才未満	1 錠	
5才未満	服用させないで下さい	

<用法・用量に関する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分とはたらき

成 分	分量 (9 錠中)	は たら き
アセトアミノフェン	900mg	発熱や頭痛、のどの痛みなどをやわらげます。
フマル酸クレマスチン	1.34mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまりをしずめます。
塩酸クロベラスチン	48mg	せきをしずめます。
dl-塩酸メチルエフェドリン	60mg	気管支をひろげて、たんを出しやすくし、せきもしずめます。
塩化リゾチーム	60mg (力価)	鼻やのどの炎症をしずめ、たんをきれやすくします。
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	たんをうすめて、きれやすくします。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
甘草エキス末	117mg	のどの痛みをやわらげます。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファー化デンプン、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、酸化チタン、マクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

ワンポイント情報

かぜは、からだの抵抗力が低下した時に起こりやすい急性炎症の一種です。
“かぜは万病のもと”といわれるように、長引かせると、体力を消耗し悪循環を起こし、いろいろな病気の原因にもなります。栄養バランスのよい食事を心がけ、十分な睡眠をとり、からだの抵抗力の回復を助けて、長引かせないようにすることが大切です。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

東京都千代田区三軒町1-3-12

(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝祭日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36