

この説明書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

第②類医薬品

総合かぜ薬

# フクナガ フジコール錠

フマル酸クレマスチン・塩化リゾチーム配合

## 製品の特徴

フクナガフジコール錠は、鼻水・鼻づまりによく効くフマル酸クレマスチン、鼻やのどの炎症をしずめ、たんをきれやすくする塩化リゾチーム、炎症をしずめる作用のある甘草のエキスなど、かぜの諸症状を緩和する8つの成分を配合した総合かぜ薬です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の方は服用しないで下さい。
  - (1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないで下さい。
5. 長期連用しないで下さい。



### 相談すること

1. 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 授乳中の人
  - (4) 高齢者
  - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (7) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難
  - (8) 次の診断を受けた人  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvens・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。  
□のかわき

## 効能・効果

かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、鼻水、くしゃみ、鼻づまり、せき、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## 用法・用量

1回下記量を食後なるべく30分以内に、水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	3回
11才以上15才未満	2錠	
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用させないで下さい	

### 〈用法・用量に関する注意〉

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 成分とはたらき

成分	分量 (9錠中)	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	発熱や頭痛、のどの痛みなどをやわらげます。
フマル酸クレマスチン	1.34mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまりをしずめます。
塩酸クロベラスチン	48mg	せきをしずめます。
d <sub>l</sub> -塩酸メチルエフェドリン	60mg	気管支をひろげて、たんを出しやすくし、せきもしずめます。
塩化リゾチーム	60mg (力価)	鼻やのどの炎症をしずめ、たんをきれやすくします。
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	たんをうすめて、きれやすくします。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
甘草エキス末	117mg	のどの痛みをやわらげます。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファー化デンプン、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、酸化チタン、マクロゴールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

### ●ワンポイント情報

かぜは、からだの抵抗力が低下した時に起こりやすい急性炎症の一種です。  
“かぜは万病のもと”といわれるように、長引かせると、体力を消耗し悪循環を起こし、いろいろな病気の原因にもなります。栄養バランスのよい食事を心がけ、十分な睡眠をとり、からだの抵抗力の回復を助けて、長引かせないようにすることが大切です。

### お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室  
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1  
(03)3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



製造販売元

**湧永製薬株式会社**

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624  
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36  
<http://www.wakunaga.co.jp/>