

鎮咳去痰薬

アストフィリン[®]S

第②類医薬品

アストフィリンSは、収縮した気管支を広げる成分と、せきの発生をおさえる成分を配合した鎮咳去痰薬で、ぜんそく、せき、たんに効果があります。

また、アレルギー性のぜんそく、せきにも効果を発揮します。

アストフィリンSは、飲みやすい糖衣錠です。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる】

- ①本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- ②服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
- ③授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

- ①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人
高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん
- ②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循 環 器	動悸
泌 尿 器	排尿困難

- ③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気
- ④5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

ぜんそく、せき、たん

用法・用量

次の量を**毎食後**に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1錠 	1日3回
小児(15歳未満)	 服用しないこと	

成分と働き

成人1日量3錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
ジプロフィリン	225mg	収縮した気管支を広げて、ぜんそくやせきをしずめ、たんを出しやすくします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	18.75mg	
ノスカピン	30mg	延髄にあるせきの中樞に働き、せきの発生をおさえます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	45mg	アレルギー性のぜんそくやせきをしずめます。

[添加物]

タルク、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルナウバロウ、酸化チタン、ステアリン酸、ステアリン酸Mg、セラック、二酸化ケイ素、白糖、ヒプロメロース、プルラン、ポビドン、マクロゴール、リン酸水素Ca

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。容器のキャップを開けた後は捨ててください。本剤は落下などの衝撃で破損することがありますので取扱いには注意してください。
- ⑤容器内に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- ⑥水分が錠剤に付くと表面の一部が溶け、変色したり斑点を生じたりすることがありますので、ぬれた手で触れないでください。また、ぬれた錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に影響を与えますので注意してください。
- ⑦使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- ⑧使用期限内であっても一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から6ヵ月以内を目安に使用してください。箱の内ブタの「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン」フリーダイヤル 0120-161-454
受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



製品の内容はホームページでも紹介しています。

eisai.jp

製造販売元



サンノーバ株式会社
群馬県太田市世良田町3038-2

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

SU15836-5IX