

販売名:ジキロングZ3000

成分・分量 1日量1本(100mL)中  
チアミン硝化物10mg、リボフラビンリ  
ン酸エステルナトリウム3mg、ピリドキ  
シン塩酸塩50mg、ニコチン酸アミド  
20mg、無水カフェイン50mg、L-アル  
ギニン塩酸塩40mg、タウリン3000mg、  
ローヤルゼリー抽出液200mg(ロー  
ヤルゼリー200mgに相当)

添加物:白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ  
酸、クエン酸水和物、安息香酸Na、カラ  
メル、マクロゴール、メタリン酸Na、エタ  
ノール、香料、バニリン、プロピレングリ  
コール「(アルコール0.3mL以下)」

●本剤に配合されているリボフラビ  
ンリン酸エステルナトリウムにより、  
尿が黄色になることがある。

#### 効能・効果

滋養強壮・虚弱体质・肉体疲労・病中病  
後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性  
疾患・産前産後などの場合の栄養補給

#### 用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)  
を服用する。●用法及び用量を厳守す  
ること。●本剤は、まれに沈殿を生じる  
ことがある。よく振って服用すること。

(お客様相談室) 06-6203-5151  
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 AL06

田村薬品工業株式会社  
奈良県御所市西寺田50

## 滋養強壮・虚弱体质

### 肉体疲労時の栄養補給

ジキロングZ3000

3000mg

タウリン 3000mg  
ローヤルゼリー 200mg 配合

100mL

第3類医薬品

#### 使用上の注意

相談すること	1.服用後、次の症状があら われた場合は副作用の可能性があるので、 直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談する こと
関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

- 2.しばらく服用しても  
症状がよくならない場  
合は服用を中止し、こ  
の製品を持って医師、  
薬剤師又は登録販売  
者に相談すること

#### 保管及び取扱い 上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管す  
ること。(2)小児の手の届かない所に保管す  
ること。(3)他の容器に入れ替え  
ないこと(誤用の原因にな  
ったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた  
製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はしない  
こと。(6)長期間の低温  
保管等により、まれに結  
晶を生じることがある。

¥300+税

使用期限



4 904751101268

金属:キャップ ガラス:插  
副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

製造番号