


ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

効く かぜ薬 かぜに効く8つの成分に人参乾燥エキスとビタミン B₁・B₂をプラス アルペン®ゴールドカプセル

総合感冒薬

アルペンゴールドカプセルは、発熱、のどの痛み、鼻水、せきなどかぜの諸症状に効果のある8つの成分に人参乾燥エキスとビタミンB₁・B₂をプラスした効くかぜ薬です。



特徴

1. 発熱、のどの痛み、鼻水、せきなどの症状を伴うかぜに効く8つの成分を配合。
2. 発熱で失われるビタミンB₁・B₂を補給。
3. かぜに対する抵抗力の維持にニンジン(人参)乾燥エキスを配合。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)授乳中の人。(4)高齢者。(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7)次の症状のある人。——高熱、排尿困難、血液凝固異常(出血傾向)
 - (8)次の診断を受けた人。——甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、てんかん
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感
精神神経系	めまい
その他	排尿困難、血たん

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診察を受けること。)
ぜんそく	

(2)5~6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢、口のかわき

(裏面へ続く)

成分と働き 6カプセル(1日量)中

成分	含量	働き
イソプロピルアンチピリン* アセトアミノフェン	300 mg 450 mg	熱を効果的に下げ、かぜに伴う頭痛、 のどの痛み、関節痛・筋肉痛等をやわ らげます。
クレマスチンフマル酸塩	1.34 mg	つらい鼻水、鼻づまり、くしゃみを おさえます。
フェンジノ酸クロペラスチン ノスカピン dl-メチルエフェドリン塩酸塩	84 mg 48 mg 60 mg	体力を消耗させる原因となるせき を効果的にしずめます。
セミアルカリプロティナーゼ	30 mg (力価:60000単位)	のどの痛みをおさえ、たんの切れを よくして、出しやすくします。
無水カフェイン	75 mg	頭痛をやわらげます。
チアミン硝酸物(ビタミンB ₁ 硝酸塩) リボフラビン(ビタミンB ₂)	24 mg 12 mg	発熱で失われるビタミンB ₁ ・B ₂ を 補給します。
ニンジン(人参)乾燥エキス	100 mg (原生薬換算量1000mg)	かぜに対する抵抗力の維持を助け ます。

*ピリン系

添加物として、トウモロコシデンプン、タルク、乳糖、ポリソルベート80、
ラウリル硫酸Na、メタクリル酸コポリマーLD、白糖、マクロゴール、トリア
セチン、ゼラチン、酸化チタン、その他1成分を含有します。

効能

かぜの諸症状(発熱、のどの痛み、鼻水、せき、たん、くしゃみ、鼻づまり、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。

年齢	1回量
成人(15才以上)	2カプセル
15才未満の小児	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っている包装シート(PTPシート)の凸部を指先で強く押し
て裏面のアルミ箔を破り、カプセルを取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み
込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります)



保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限が過ぎた商品は、服用しないでください。

包 装

12カプセル・18カプセル・30カプセル(PTP包装)

お問い合わせ先

本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店
または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ライオン株式会社 お客様相談室

☎(03)3621-6830

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

0908