

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



鎮咳去痰薬

せき、たんに

第②類医薬品

# エフストリン®せきどめ液10

バクモンドウ  
麦門冬配合

®登録商標

- ・エフストリンせきどめ液10には炎症性のせきをしずめる効果を持つ生薬、麦門冬（バクモンドウ）が配合されています。
- ・エフストリンせきどめ液10はつらいせきの症状をしずめ、たんの切れをよくします。
- ・エフストリンせきどめ液10は甘くて飲み易い1回1本飲みのシロップです。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
（眠気等があらわれることがあります。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## <効能・効果>

せき、たん

## <用法・用量>

次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には、就寝前に服用してください。  
又、場合によっては、1日6回まで約4時間の間隔をおいて服用してください。

	15才以上	15才未満
1回量	1本（10mL）	服用しないこと

## 用法・用量に関する注意

定められた用法・用量を厳守してください。

## <成分・分量>

1日量6本(60mL)中

成分	分量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に作用して、せきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡げ、せきをおさえます。
グアイフェネシン	300mg	たんの切れをよくし、せきを軽くします。
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	6mg	せきやたんの原因となるアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	120mg	各成分の働きを高め、眠気をおさえます。
バクモンドウ流エキス (バクモンドウ1.25gに相当)	1.25mL	炎症性のせきを鎮めます。

添加物：カラメル、精製白糖、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸、パラベン、プロピレングリコール、香料、エタノール、エチルバニリン、グリセリン、バニリン

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記にお願い致します。  
大昭製薬株式会社 おくすり相談室  
電話 0748-88-4181  
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **大昭製薬株式会社**

〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168