

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

のどのはれ・痛み・声がれに

# バポン<sup>®</sup>トローチ

（リゾチーム塩酸塩配合）

第3類医薬品

## 特徴

1. のどのはれ、痛みを抑える消炎酵素 リゾチーム塩酸塩、消炎剤 グリチルリチン酸二カリウムと殺菌消毒剤 デカリニウム塩化物を配合した、淡青緑色～青緑色のドーナツ形のトローチ剤です。
2. さわやかな甘みと芳香を有し、口内に清涼感を与えると共に、のどのはれ、痛み、口臭等の不快症状を抑えます。



## 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）  
次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。

（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 成分(1錠中)

リゾチーム塩酸塩	5.0mg(力価)
グリチルリチン酸二カリウム	2.5mg
デカリニウム塩化物	0.25mg
添加物：白糖、還元麦芽糖水アメ、ヒプロメロース、DL-リンゴ酸、L-メントール、ケイ酸Al、ステアリン酸Ca、香料、緑色3号	

## 効 能

のどの炎症によるのどのはれ・のどの痛み・のどの荒れ・のどの不快感・声がれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

## 用法・用量

7才以上、1回1錠を2時間以上の間隔をおいて1日6回、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもと使用してください。
- (3) かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

## トローチ剤の取り出し方

右図のようにトローチ剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品のお問い合わせは、下記をお願いいたします。  
田辺三菱製薬「くすり相談センター」  
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)  
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30



販売元  
田辺三菱製薬株式会社  
大阪市中央区北浜2-6-18

製造販売元  
前田薬品工業株式会社  
富山市向新庄町1丁目18番47号