

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ビーエスバンE[®]

⚠️【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
こりやすくなります〉

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してく
ださい

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持
って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、
しもやけ、骨折痛

製造番号

使用期限

1枚(6.5cm×4.2cm)

【用法・用量】

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部に
貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監
督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮ふは清潔にし、汗等をよく拭き取っ
てからお貼りください。
- (3) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱
い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日
以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が
起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 皮ふの特に弱い人は、同じところには続けて貼
らないでください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量
dl-カンフル	1.21g
l-メントール	7.25g
サリチル酸メチル	5.44g
トコフェロール酢酸エステル	1.29g

添加物としてBHT、エステルガム、酸化亜鉛、生ゴム、
ポリブテン、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所
に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用
の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、保存袋
に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂** 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電話 (0942)83-2112 受付時間 午前9:00～11:45 午後1:00～4:30(土、日、祝日を除く)